

## معیار ولز جهت ترومبوز وریدی

نمره اکتسابی	نمره	یافته های بالینی برای آمبولی ریوی-PET	نمره اکتسابی	نمره	یافته های بالینی برای DVT
	+۳	وجود علائم بیماری DVT		+۱	جراحی ویا گچ در اندام تحتانی - پارزی یا پارالایزی
	+۳	تشخیص افتراقی دیگری که علائم بیمار را توجیه کند نداشته باشیم		+۱	بستری در تخت بیش از سه روز یا جراحی بزرگ در چهار هفته قبل
	+۱.۵	ضربان قلب بالای ۱۰۰		+۱	تندرنس در مسیر ورید های پشت زانو یا رانی
	+۱.۵	بی حرکتی بیش از سه روز یا جراحی در چهار هفته اخیر		+۱	تورم یک عضو
	+۱.۵	سابقه قبلی از TE و DVT		+۱	ادم گوده گذار در اندام مبتلا
	+۱	وجود خلط خونی		+۱	تورم بیش از سه سانت یک پا نسبت به پای دیگر در ۱۰ سانتی متری زیرزانو
	+۱	بدخیمی حاد یا درمان شده در طول شش ماه قبل یا درمان تسکینی		+۱	تورم عروق محیطی که ناشی از واریس نباشد
				+۱	داشتن سابقه DVT قبلی
				+۱	بدخیمی حاد یا درمان شده که شش ماه قبل بوده است
				+۳	تزریق وریدی دارو
				-۱	تشخیص جایگزین با احتمال بیشتری نسبت به DVT
					۰-۱ احتمال کم ۱-۲ احتمال متوسط ۲-۸ احتمال بالا
					<۲ نمره احتمال کم ۲-۶ احتمال متوسط >۶ نمره احتمال بالا

واحد ایمنی مرکز آموزشی درمانی علوی