

تحول در درمان سکته مغزی

تحولی در درمان سکته مغزی ایسکمیک (لخته خون) ایجاد شده که با درمان زود هنگام با عوامل حل کننده لخته باعث میشود تا سکته های مغزی با عوارض کمتری همراه باشند. این دارو که به نام Alteplase (-Rtpa) میباشد که **تحت شرایطی** باید ظرف مدت کمتر از ۳ ساعت پس از بروز سکته مغزی تزریق شود.

به محض رویت هر یک از علائم درنگ نکنید و بلافاصله به اورژانس اطلاع دهید. کنترل زمان رابه یاد داشته باشید تا بدانید اولین نشانه ها چه زمان رخ میدهد. هرچه زمان رسیدن بیمار به بیمارستان کمتر باشد میتوان از صدمات بیشتری جلوگیری کرد.

سکته مغزی قابل

پیشگیری و درمان

است.

عوامل خطر ایجاد کننده سکته مغزی

۱- علایمی که با خود مراقبتی قابل کنترل میباشد.

✓ فشار خون بالا و کلسترول

✓ چاقی و دیابت

✓ کم تحرکی

✓ استعمال دخانیات

✓ مصرف الکل

۲- غیر قابل کنترل

✓ سن

✓ جنس: در مردان بیشتر از زنان است

✓ سابقه فامیلی

✓ سکته مغزی قبلی

✓ بیماریهای مادر زادی

تهیه و تنظیم: ناهید پناهی (کارشناس آموزش بیمار)

تأیید کننده: کارگروه علمی بیمارستان علوی

صدای

سکته

مغزی را

بشنویم



دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

مرکز آموزشی درمانی علوی

علایم سکته مغزی

که باید هر چه

سریعتر از

اورژانس (۱۱۵)

کمک بخواهید.

علایم بستگی به محل و شدت سکته

مغزی شامل موارد زیر است

◀ بی حسی یا ضعف عضلات صورت

◀ ضعف در دست و پای یک طرف بدن

◀ گیجی یا تغییر در وضعیت ذهنی

◀ اشکال در سخن گفتن یا درک

صحبت دیگران

◀ اختلالات بینایی

◀ فقدان تعادل یا سرگیجه

فاکتور زمان مهم است درمان سریع

شانس جلوگیری از عوارض سکته

مغزی را افزایش میدهد.