

## مراقبت از نوزاد در کرونا

آموزش به خانواده:

در خانواده‌ای که افراد، سالم بوده و مبتلا به کووید ۱۹ نیستند، رعایت موارد زیر در مراقبت از نوزاد مشکوک یا مبتلا الزامی است:

- مطابق دستور عملهای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، مادر یا فرد مراقب نوزاد در منزل باید اصول بهداشت فردی و پیشگیرانه را پیش و پس از هرگونه مراقبت و تماس با نوزاد (تغذیه نوزاد، تعویض پوشک، تماس با مایعات و ترشحات بدن نوزاد و ...) رعایت کند و دستان خود را حداقل به مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون مایع یا مواد ضد عفونی کننده با پایه الكل حداقل٪ ۷۰ بشوید. از ماسک و دستکش یک بار مصرف استفاده کند و پس از انجام مراقبت‌ها ماسک و دستکش را با رعایت اصول بهداشتی دور اندازد و دوباره دست‌ها را به مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشوید.
  - مراقب نوزاد غیر از مادر، نباید در گروه افراد در معرض خطر (مانند دیابت، بیماری قلبی، نقص ایمنی و...) باشد.
  - تماس پوستی با نوزاد به حداقل ممکن کاهش یابد و از در آغوش کشیدن و بوسیدن نوزاد جدا پرهیز گردد. بر بالین نوزاد تجمع صورت نگیرد.
  - از شرکت کردن و همراه بدن نوزاد در مهمانی‌ها و مراکز تجمع به جز در موارد ضروری (ایمن سازی و...) پرهیزشود. در صورت مراجعت برای دریافت خدمات ضروری مانند ایمن سازی رعایت فاصله گذاری اجتماعی (فاصله ۲ متری ازدیگران) مورد توجه قرار گیرد.
  - از مصرف مواد دخانی (سیگار، قلیان و ...) در منزل پرهیز شود. نوزاد و مادر هم اتاق باشند ولی تخت مشترک نداشته باشند.
  - در صورت نیاز به شیر دوشیده شده مادر برای تغذیه شیرخوار، جمع آوری و ذخیره شیر باید با رعایت اصول بهداشتی انجام شود. در صورت استفاده از شیردوش دستی یا برقی، مادر باید دست‌های خود را پیش از لمس قسمت‌های پمپ یا ظرف ذخیره سازی شیر بشوید. پس از هر نوبت شیردوشی، باید همه اجزای شیردوش که با پستان و دست مادر در تماس بوده، شسته و ضد عفونی شوند.
  - در صورتی که نوزاد از شیر مصنوعی استفاده می‌کند، رعایت اصول بهداشتی در زمان شستشوی ظرف شیر و تهییه شیر مصنوعی مورد تاکید قرار گیرد.
- در صورت وجود فرد مشکوک یا مبتلا به بیماری کووید ۱۹ در خانواده، علاوه بر توصیه‌های بالا، رعایت موارد زیر الزامی است:
- در صورت امکان در منزل، یک اتاق جداگانه برای نوزاد اختصاص یابد و در صورت در دسترس نبودن اتاق جداگانه، نوزاد باید حداقل ۲ متر از فرد مشکوک یا مبتلا به کووید ۱۹ و نیز از افراد سالم، فاصله داشته باشد

# مراقبت از نوزاد در کرونا

- در صورتی که فرد مشکوک به ابتلا به کووید ۱۹ ، مادر نوزاد است ، در صورت بستری نشدن مادر یا مرخص شدن وی از بیمارستان به علت بیماری کووید ۱۹ ، مادر و نوزاد می توانند با رعایت الزامات قرنطینه خانگی در کنار هم باشند. تعذیه شیرخوار از پستان مادر به شرط رعایت اصول بهداشتی (شستشوی دست و زدن ماسک ) منع ندارد.
- مادر یا فرد مراقب نوزاد در منزل، پیش و پس از هرگونه مراقبت و تماس با نوزاد ( تعذیه نوزاد، تعویض پوشک، تماس با مایعات و ترشحات بدن نوزاد ...) ، دستان خود را با آب و صابون مایع حداقل به مدت ۲۰ ثانیه بشوید و از ماسک و دستکش یک بار مصرف استفاده نماید و پس از انجام مراقبت ها، ماسک دستکش را با رعایت اصول بهداشتی دور اندازد.
- در صورت بروز علایم ناخوشی در نوزاد (پایین آمدن یا افزایش مشخص دمای بدن نوزاد، تنفس تندری یا سایر مشکلات تنفسی، خوب شیر نخوردن، استفراغ مکرر، اختلال هوشیاری ...) نوزاد بلا فاصله به بیمارستان منتقل شود.
- اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی کرونا ، خوب است و در بیمارستان بستری نشده، نوزاد بدون علامت باید به مدت ۱۰ روز قرنطینه خانگی شود و تعذیه نوزاد زیر پستان مادر و با رعایت اصول بهداشتی صورت گیرد . اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی، خوب است، شیردهی مستقیم از پستان باید با رعایت نکات بهداشتی مطابق دستور عمل ها انجام گیرد.
- در صورتی که مادر قادر به شیردهی مستقیم از پستان نیست ولی تمایل به شیردوشی دارد، از شیر دوشیده او و با استفاده از روشن های جایگزین مناسب مانند فنجان ( بجز بطری ) نوزادش تعذیه شود.
- در نوزادان بد حال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان، به مادر با علایم خفیف یا متوسط، تأکید گردد در فواصل هر دو تا سه ساعت، شیر خود را با رعایت اصول بهداشتی ذکر شده، بدوشد و ذخیره نماید تا جریان شیر قطع نگردد . مادر حین شیردوشی ماسک داشته باشد . شیر دوش باید برای مادر اختصاصی بوده از شیردوش های مشترک استفاده نشود.

شما این محتوا را میتوانید از سایت بیمارستان علوی از قسمت بمنابعهای آموزشی دانلود کنید.

تپهه کننده: ناهید پناهی ( سوپرولیزرآموزش سلامت )

زیر نظر: دکتر خلفی

ارتباط: arums.ac.ir/alavi/fa

منبع: دستورالعمل کشوری کووید ۱۹

تایید کننده: کارگروه آموزش بیمار مركز درمانی علوی

تاریخ تهیه: ۱۳۹۹-۰۴-۲۲۲۴۸۸۸