



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

داروی ریواروکسابان (Rivaroxaban)

نام های تجاری: زارلتو، زالربان، اکسابین

طبقه بندی بالینی: ضد انعقاد

اشکال در دسترس: قرص: ۱۰mg، ۱۵mg، ۲۰mg

این دسته از داروها برای درمان و پیشگیری از بعضی مشکلات انعقادی (لخته شدن خون) تجویز میشود. این مشکلات شامل موارد زیر هستند:

- کاهش ریسک سکتة های مغزی و آمبولی (لخته شدن خون) در بیماران مبتلا به فیبرینولیتیک
 - دهلیزی (بی نظمی در ضربان قلب)
 - درمان آمبولی ریه (لخته شدن خون در عروق ریه) و پیشگیری از بروز مجدد آن
 - درمان لخته در وریدهای عمقی اندام ها و پیشگیری از بروز مجدد آن
 - جلوگیری از لخته شدن خون در وریدها پس از عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو و لگن
- مواردی که داروی ریواروکسابان نباید مصرف کرد.
- حساسیت مفرط به دارو، در صورت داشتن خونریزی شدید، داشتن مشکلات کبدی و کلیوی، فشار خون کنترل نشده.

هشدارها و موارد احتیاط

- فقط با نظر پزشک دارو را قطع کنید و یا سایر داروها را استفاده کنید.
- از الکل، آسپرین و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (ایبو پروفن و دیلوفناک و ..) بپرهیزید.
- دوزاژ دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- قبل از جراحی و امور دندانپزشکی با پزشک مشورت کنید.
- از ریش تراش و مسواک نرم استفاده کنید.
- هرگونه خونریزی و کبودی غیر معمول را به پزشک گزارش دهید.
- در صورت بارداری و یا برنامه ریزی برای بارداری را به پزشک گزارش دهید.
- علائمی همچون سردرد، درد شکمی، گیجی، ضعف، تغییرات بینایی، توجه کنید.
- در صورت فراموشی یک نوبت دارو هرگز دوز دارو را در نوبت بعدی دو برابر نکنید.
- رژیم غذایی سالم داشته باشید. ورزش کنید. بهداشت را رعایت کنید. واکسیناسیون را طبق برنامه کشوری انجام دهید. در روز تزریق واکسن برای بیماری کرونا داروی ریواروکسابان را بعد از تزریق میل نمایید.

تهیه کننده: ناهید پناهی (سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان علوی) منبع: کتاب داروهای ژنریک ایران

تایید کننده: دکتر نگار فرهودی (متخصص مغز و اعصاب)

تاریخ تهیه: ۱۴۰۰